

# Febre Amarela 2018

31 de Janeiro de 2018 , 15:21

Atualizado em 15 de Maio de 2018 , 17:08

## Febre amarela

Procure uma Unidade Básica de Saúde e vacine-se!



A **Febre Amarela** é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos vetores e possui dois ciclos de transmissão: silvestre (quando há transmissão em área rural ou de floresta) e urbano. Em áreas de mata, os principais vetores são os mosquitos **Haemagogus** e **Sabethes**. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa.

Para o enfrentamento da doença, o [Sistema Único de Saúde \(SUS\)](#) oferece gratuitamente a vacina por meio do [Calendário Nacional de Vacinação](#) nas Unidades Básicas de Saúde (também conhecidas como Posto de Saúde).



### Linha do tempo | 2017 | 2018

Clique aqui e confira as ações do Governo de Minas para controle, enfrentamento e prevenção da Febre Amarela.



## Informe Epidemiológico da Febre Amarela

» [Clique aqui](#) e confira os **Informes Epidemiológicos da Febre Amarela**

» **Acesse os dados de cobertura vacinal em Minas Gerais, [neste link](#) - atualização em 15/03/2018**

## Orientações para Profissionais de Saúde sobre Febre Amarela

» **Confira documentos e links com conteúdo de interesse:**

1. [Fluxograma para Atendimento de Febre Amarela](#) (3ª Versão de 2018 - atualizado pela SES-MG em 05/03/2018)
2. [Hospitais de Referência para atendimento de Febre Amarela](#)
3. [Nota Técnica nº 03/2018 - Vacina Febre Amarela](#) - atualização em 13/03/2018
4. [Nota Técnica nº 94/2017 - Orientações e indicação de dose única da vacina de Febre Amarela](#)
5. [Webaula sobre Febre Amarela do Centro de Telessaúde do Hospital das Clínicas da UFMG](#)
6. [Webaula sobre a vacinação contra a Febre Amarela com o Dr. José Geraldo](#)
7. [Manejo Clínico da Febre Amarela](#)
8. [Questionário para investigação de casos suspeitos de Febre Amarela](#)
9. [Nota do Coren-MG acerca da aplicação da vacina](#)

## Conheça a doença e tire suas dúvidas!

A maior frequência da Febre Amarela ocorre entre os meses de dezembro e maio, período com maior índice de chuvas, quando aumenta a proliferação do vetor, o que coincide ainda com maior atividade agrícola. A infecção acontece quando uma pessoa que nunca tenha contraído a febre amarela, ou tomado a vacina contra a doença, é picada por um mosquito infectado, o Haemagogus e o Sabethes.

Geralmente, quem contrai este vírus não chega a apresentar sintomas ou os mesmos são muito fracos. As primeiras manifestações da doença são repentinas: febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de três dias. A forma mais grave da doença é rara e costuma aparecer após um breve período de bem-estar (até dois dias), quando podem ocorrer insuficiências hepática e renal, icterícia (olhos e pele amarelados), manifestações hemorrágicas e cansaço intenso. A maioria dos infectados se recupera bem e adquire imunização permanente contra a febre amarela.

A medida mais importante para prevenção e controle da febre amarela é a vacinação. Por este motivo, o [Ministério da Saúde](#) alerta que, toda a população que reside ou que se desloque para regiões silvestres, rurais ou de mata de áreas com recomendação de vacina (ACRV), deve se imunizar na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua casa.

» [Clique aqui](#) e confira as **PERGUNTAS E DÚVIDAS MAIS FREQUENTES** sobre a **Febre Amarela**.

» [Clique aqui](#) e saiba o que fazer quando encontrar macacos mortos ou doentes em área rural, de mata ou silvestre.

## Esquema Vacinal

A vacina é recomendada a todas as pessoas, principalmente aquelas que moram ou vão viajar para áreas com indícios de febre amarela. Está disponível, por meio do [Sistema Único de Saúde \(SUS\)](#), em todas as unidades de saúde, e deve ser administrada pelo menos 10 dias antes do deslocamento para áreas de risco. As pessoas que não estiverem com doses em dia, precisam atualizar o cartão de vacina.

» [Clique aqui](#) e conheça o **Esquema Vacinal** para a Febre Amarela

Em abril de 2016, foi adotada a dose única da vacina contra Febre Amarela no SUS em Minas Gerais. Isso significa que apenas uma dose é capaz de imunizar por toda a vida, não havendo mais a necessidade de reforço. A medida foi proposta pelo Ministério da Saúde, que recomenda a dose única seguindo orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

» [Clique aqui](#) e confira uma **Nota de Esclarecimento** sobre a vacina contra a **Febre Amarela**.

» [Clique aqui](#) e confira a Nota Técnica do Ministério da Saúde sobre a dose única da vacina contra a Febre Amarela.



» [Clique aqui](#) e faça o download do material da campanha!

No link acima você encontra todo o material gráfico, digital e audiovisual da campanha. Ele está disponível para download e reprodução, desde que seja preservado e respeitado o conteúdo original e a ficha técnica.

Compartilhe com a sua rede!

## Histórico da doença no Estado

Em Minas Gerais ocorreram dois surtos de Febre Amarela entre os anos de 2001 a 2003 em regiões distintas. O primeiro surto, em 2001, ocorreu na região do Centro-Oeste mineiro, quando foram confirmados 32 casos humanos de febre amarela com 16 óbitos. Abrangeu 12 municípios da região e confirmou-se a origem silvestre da doença em todos os casos. Foi realizada vacinação casa a casa de toda a população da região, fator que contribuiu bastante para evitar o surgimento de novos casos.

[\[continue lendo...\]](#)

[Enviar para impressão](#)