

ANEXO I – Notificações NOTIVISA

As situações em que serão necessárias realizar a notificação no NOTIVISA estão descritas no quadro 1 abaixo.

Quadro 1: Situações em que é necessário realizar notificação no Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária (NOTIVISA) e como proceder.

Situação	Quem notifica?	Quando comunicar? *	Quando notificar?	Notificação
Receptor é identificado, localizado, mas não comparece ao Serviço de assistência à saúde onde recebeu a transfusão	Serviço de hemoterapia que realizou a transfusão	Dentro das primeiras 72 horas subsequentes à identificação do evento	Até o 15º dia útil do mês subsequente à identificação do evento	Reação transfusional do tipo Transmissão de outras doenças infecciosas (DT), com correlação "inconclusiva". Caso o receptor compareça posteriormente, retificar a notificação alterando a correlação conforme resultado dos testes
Receptor comparece e é confirmado com o mesmo marcador do doador	Serviço de hemoterapia que realizou a transfusão	Dentro das primeiras 72 horas subsequentes à identificação do evento	Até do 15º dia útil do mês subsequente à identificação do evento	Reação transfusional do tipo Transmissão de outras doenças infecciosas (DT), atribuindo a correlação aplicável
Receptor comparece e, nesse momento, não apresenta positividade para o mesmo marcador do doador. Aguardar o prazo mínimo de acompanhamento laboratorial para verificar a transmissão por transfusão, em caso positivo notificar	Serviço de hemoterapia que realizou a transfusão	Dentro das primeiras 72 horas subsequentes à identificação do evento	Até do 15º dia útil do mês subsequente à identificação do evento	Reação transfusional do tipo Transmissão de outras doenças infecciosas (DT), de acordo com a correlação com a transfusão, exceto se a correlação com a transfusão tiver sido descartada

Óbito do receptor	Serviço de hemoterapia que realizou a transfusão	Dentro das primeiras 72 horas	Dentro das primeiras 72 horas	Reação transfusional do tipo Transmissão de outras doenças infecciosas (DT), com correlação inconclusiva, exceto se há evidência de que antes do óbito a doença transmissível tenha sido investigada
Retrovigilância iniciada a partir da positividade de marcador em receptor de sangue/ hemocomponente	Serviço de hemoterapia que realizou a transfusão	Dentro das primeiras 72 horas subsequente à identificação do evento	Até do 15º dia útil do mês subsequente à identificação do evento	Reação transfusional do tipo Transmissão de outras doenças infecciosas (DT), de acordo com a correlação com a transfusão, exceto se a correlação com a transfusão tiver sido descartada.
Indústria detecta positividade dos marcadores em hemocomponente: HCV, HBV e HIV	Serviço produtor do hemocomponente	Dentro das primeiras 72 horas subsequente à identificação do evento	Até do 15º dia útil do mês subsequente à identificação do evento	Quase- erro grave, incidente grave com ou sem reação adversa, a depender do caso

*As comunicações deverão ser realizadas no e-mail: notificasangue@saude.mg.gov.br

