

OS SINAIS DE ALARME PODEM SURTIR A PARTIR DO 3º DIA DA DOENÇA, MESMO QUE JÁ TENHA ABAIXADO A FEBRE, E SUGEREM PIORA DA DOENÇA. CASO APRESENTE UM DESSES SINAIS, PROCURE O SERVIÇO DE SAÚDE.

SINAIS DE ALARME:

- Dor forte e constante na barriga
- Vômitos frequentes
- Dificuldade para respirar
- Sensação de tontura e/ou desmaio
- Sangramentos
- Agitação e muita sonolência

ORIENTAÇÕES:

- Fique em repouso.
- Beba no mínimo 2 litros de líquido por dia, entre água, chá, suco, água de coco, leite, sopa e soro hidratante (pode ser caseiro). O soro hidratante é fornecido nas Unidades Básicas de Saúde.

Receita de soro caseiro:

1 colher de café de sal de cozinha
2 colheres de sopa de açúcar
1 litro de água filtrada

- Não use medicamentos para dor e febre que contenham Ácido Acetil-salicílico (AAS) durante o período da doença.
- As mulheres com dengue devem continuar amamentando.



Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Saúde

Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde
Superintendência de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador

CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO DENGUE/ZIKA

NOME:		
NOME DA MÃE:		
DATA DE NASCIMENTO:	SEXO: ☐ MASC. ☐ FEM.	TELEFONE:
BAIRRO:		
Nº CARTÃO SUS/PRONTUÁRIO:		
UNIDADE DE SAÚDE:		
UNIDADE DE REFERÊNCIA:		

APRESENTAR ESTE CARTÃO SEMPRE QUE RETORNAR À UNIDADE DE SAÚDE.

Data de início dos sintomas: ____/____/____

ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE

DATA	P.A. EM PÉ	P.A. DEITADO	PROVA DO LAÇO	TEMPERATURA	SANGRAMENTO

COLETA DE EXAMES

DATA	LABORATÓRIO	HEMATÓCRITO	PLAQUETAS	LEUCÓCITOS

Ns1 ____/____/____

Isolamento viral ____/____/____


Sorologia ____/____/____

Presença de comorbidades

Medicações em uso

Observações:

EVOLUÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL DA DENGUE



FONTE: WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO (2009), COM ADAPTAÇÕES.