

Informe Epidemiológico

Influenza: Monitoramento até a Semana Epidemiológica 35 de 2016

INTRODUÇÃO

A influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, que pode levar ao agravamento e ao óbito, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco para as complicações da infecção (crianças menores de 5 anos de idade, gestantes, adultos com 60 anos ou mais, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais).

Os vírus influenza são os mais frequentemente identificados nos casos de Síndrome Gripal e também nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, mas a infecção pela doença pode causar sintomas que se confundem com os encontrados em diversas outras infecções virais e bacterianas.

A Síndrome Gripal, manifestação mais comum da doença, se caracteriza pelo aparecimento súbito de febre, cefaleia, dores musculares (mialgia), tosse, dor de garganta e fadiga. Quando estes sintomas vêm associados a uma dificuldade respiratória com necessidade de hospitalização, o quadro apresentado é a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – a notificação às autoridades de saúde é obrigatória na ocorrência de hospitalização ou óbitos.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

A vigilância da influenza no Brasil é composta pela vigilância sentinela de Síndrome Gripal (SG)¹, de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)² em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e pela vigilância universal de SRAG. Os vírus respiratórios pesquisados são: influenza A, (A/H1N1, A/H1, A/H3 e A não subtipado), influenza B, Vírus Sincicial Respiratório, Parainfluenza, Adenovírus, Metapneumovírus, Bocavírus e Rinovírus.

Em Minas Gerais a vigilância sentinela conta com uma rede de unidades de pronto atendimento em Belo Horizonte, Contagem, Betim e Pouso Alegre, 04 hospitais da capital e FUNED e tem como objetivo principal identificar os vírus respiratórios circulantes, além de permitir o monitoramento da demanda de atendimento por essa doença. A vigilância universal de SRAG monitora os casos hospitalizados e óbitos com o objetivo de identificar o comportamento da influenza no estado subsidiando a tomada de decisão em situações especiais. Os dados são coletados por meio de formulários padronizados e inseridos nos sistemas de informação online: SIVEP-Gripe e SINAN Influenza Web.

As informações apresentadas nesse informe são referentes ao período que compreende as semanas epidemiológicas (SE) 01 a 35 de 2016, ou seja, casos com início de sintomas de 03/01/2016 a 03/09/2016.

RESUMO DA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA

- Em Minas Gerais, a positividade para influenza, outros vírus respiratórios e outros agentes etiológicos entre as amostras processadas em unidades sentinelas foi de 9,8% (66 / 674) para SG e de 20,0% (18/90) para SRAG em UTI.
- Na vigilância universal de SRAG, foram confirmados para Influenza 26,5% (601 /2270) do total de casos com amostra coletada, predominando com 65,6% o vírus influenza A(H1N1)pdm09 (378/ 601) e 34,4% do vírus Influenza A não subtipado (198/ 601). Entre os óbitos por SRAG, 35,7% (215 /607) foram confirmados

¹ **Síndrome Gripal (SG):** indivíduo com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e início dos sintomas nos últimos 07 dias.

² **Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG):** indivíduo hospitalizado com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e que apresente dispneia. Também podem ser observados os seguintes sinais: saturação de O₂ menor que 95% ou desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória.

para influenza, identificando o vírus influenza A(H1N1)pdm09 (149/ 215), o vírus Influenza A não subtipado (60/ 215) e o vírus influenza B (3/ 215).

VIGILÂNCIA SENTINELA DE INFLUENZA

As informações sobre a vigilância sentinela de influenza apresentadas neste informe baseiam-se nos dados inseridos no SIVEP-Gripe pelas unidades sentinelas do Estado.

Síndrome Gripal

No Estado, até a SE 35 de 2016 as unidades sentinelas de SG coletaram 674 amostras. Destas, 238 (35,3%) foram processadas e 27,7% (66 / 238) tiveram resultado positivo para vírus respiratórios e outras etiologias. Entre os vírus respiratórios, 43 (65,2%) foram positivos para influenza, 20 (30,3%) para outros vírus respiratórios (Adenovírus, Metapneumovírus e Parainfluenza). Dentre as amostras positivas para influenza, 8 (18,6%) foram decorrentes de influenza B e outras 38 (88,4) foi identificado o vírus influenza A. Entre os outros vírus respiratórios houve predomínio da circulação de Parainfluenza, com 60,0% (12/ 20) das amostras positivas (Figura 1).

A partir da análise de amostras positivas, recebidas das unidades sentinelas pela FUNED, destacou-se a circulação dos vírus influenza A(H1N1), Influenza A não subtipado, Influenza B e Parainfluenza. No entanto, apesar da regular coleta de amostras para pesquisa, algumas unidades nada coletaram neste ano. O número de coletas recomendado pela vigilância está aquém do esperado, situação esta que dificulta a melhor identificação de mudanças no padrão sazonal de vírus respiratórios circulante no estado.




Figura 1. Distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinelas de Síndrome Gripal, por semana epidemiológica de início dos sintomas. Minas Gerais, 2016 até a SE 35 .

Síndrome Respiratória Aguda Grave em UTI

Em relação às amostras coletadas pelas unidades sentinelas de SRAG em UTI, foram feitas 90 coletas, sendo 62 (68,9%) processadas. Dentre estas, 29,0% (18/62) foram positivas para vírus respiratórios, sendo 83,3% (15/18) para influenza e 16,7% (3 / 18) para outros vírus respiratórios (Vírus Sincial Respiratório, Bocavírus e Parainfluenza).

No ano de 2015, até a semana 35, a rede sentinela havia registrado no sistema 116 casos de SRAG em UTI com 86,2% (100/116) de amostras processadas. Dentre estas, 21 (21%) foram positivas para vírus respiratórios, sendo 11 (52,4%) para influenza e 10 (47,6%) para outros vírus respiratórios. Das amostras positivas para influenza foram detectados 09 influenza A (H3N2), 01 influenza B e 01 influenza A (H1N1). Entre os outros vírus respiratório, foram

detectados (02) Vírus Sincicial Respiratório, (01) Parainfluenza 2, (01) Parainfluenza 3, (02) Adenovírus e (04) Metapneumovírus.

SÉRIE HISTÓRICA DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE

No Brasil e em Minas Gerais, a partir da pandemia de Influenza (H1N1) ocorrida em 2009 é que medidas de prevenção, controle e tratamento começaram a ser amplamente divulgadas pelas autoridades públicas e o Ministério da Saúde estabeleceu como estratégia a abordagem sindrômica para a Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Vírus Influenza	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos
Influenza B	4	-	1	1	-	-	26	2	110	8	19	2	18	3	22	3
Influenza A(H1N1)pdm09	932	168	7	3	26	4	132	42	457	117	33	16	6	2	378	149
Influenza A(H1) Sazonal	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Influenza A(H3) Sazonal	-	-	-	-	-	-	21	-	50	9	85	14	63	9	-	-
Influenza A não subtipado	334	46	13	-	36	7	103	10	43	14	14	4	2	1	198	60
Sem Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
TOTAL	1.270	214	21	4	62	11	283	54	661	148	152	36	89	15	601	215

(1) Dados referentes ao período de 2009 a 2012 consideraram somente as fichas com clínica de síndrome respiratória aguda grave e excluí casos de síndrome gripal.

(2) As fichas de investigação foram alteradas a partir do final do ano de 2012 assim critérios de classificação etiológica são diferentes no período que antecede a modificação para os utilizados atualmente.

Figura 2. Série histórica de frequência de casos e óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza, segundo identificação do vírus influenza. Minas Gerais, 2009-2016.

VIGILÂNCIA UNIVERSAL DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE

Perfil Epidemiológico dos Casos

Até a SE 35 de 2016 foram notificados 4378 casos de SRAG, sendo 2270 (51,9%) com amostra coletada e processada. Dos casos com amostras processadas, 26,5% (601 /2270) foram classificados como SRAG por influenza e 3,2% (72 /2270) como outros vírus respiratórios. Dos casos associados a influenza, 95,8% (576/ 601) eram influenza A e 3,7% (22/ 601) influenza B. Naqueles em que foi identificado o vírus A, o subtipo A(H1N1)pdm09 é o de maior proporção com 65,6% (378/576) e outros 34,4% (198/576) eram influenza A não subtipado e (Figura 3 e Anexo 1).




Figura 3. Distribuição dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave segundo agente etiológico e semana epidemiológica do início dos sintomas. Minas Gerais, 2016 até a SE 35 .

Os casos de SRAG por influenza apresentaram uma mediana de idade de 50 anos, variando de 0 a 97 anos. Em relação à sua distribuição, os municípios com maior número de casos de SRAG por influenza foram Belo Horizonte (81/560), Uberlândia (26/560), dos residentes do estado. No total, 174 municípios do estado identificaram SRAG associadas à influenza em pacientes residentes, sendo associadas ao **subtipo A(H1N1)** os municípios Aimorés (1), Almenara (1), Alpinópolis (1), Andradas (7), Araguari (2), Araxá (6), Arceburgo (1), Areado (1), Arinos (1), Astolfo Dutra (1), Augusto de Lima (1), Barão de Cocais (1), Barbacena (5), Belo Horizonte (47), Belo Vale (1), Betim (4), Bom Despacho (1), Bom Sucesso (1), Brasília de Minas (2), Campanha (3), Campo Belo (6), Campos Altos (1), Campos Gerais (1), Capitólio (1), Carmo de Minas (1), Cataguases (2), Caxambu (1), Cipotânea (1), Conceição das Alagoas (1), Conselheiro Lafaiete (4), Contagem (14), Coromandel (3), Coronel Fabriciano (1), Cruzília (6), Curvelo (2), Diamantina (1), Divinópolis (6), Dolores do Indaiá (3), Elói Mendes (1), Esmeraldas (1), Extrema (4), Felixlândia (2), Formiga (3), Frutal (10), Funilândia (1), Gouveia (1), Governador Valadares (2), Guanhães (1), Guaranésia (1), Guaxupé (1), Ibiá (2), Ibititê (2), Ilópolis (1), Ingaí (1), Ipanema (2), Itabira (3), Itaguara (1), Itajubá (3), Itambacuri (1), Itapeverica (5), Itapeva (1), Itaúna (2), Ituiutaba (1), Jacutinga (1), João Monlevade (1), Juatuba (1), Juiz de Fora (6), Ladainha (1), Lagoa da Prata (1), Lavras (7), Leopoldina (2), Liberdade (1), Mariana (3), Maripá de Minas (1), Mateus Leme (1), Monsenhor Paulo (2), Monte Santo de Minas (2), Montes Claros (4), Morada Nova de Minas (1), Muriaé (2), Muzambinho (1), Nepomuceno (4), Nova Lima (1), Nova Resende (1), Novo Cruzeiro (2), Ouro Fino (2), Paracatu (2), Pará de Minas (2), Paraguaçu (2), Passos (3), Patos de Minas (5), Patrocínio (2), Pedro Leopoldo (2), Piranga (1), Piranguçu (1), Piranguinho (1), Pitangui (1), Poços de Caldas (3), Ponte Nova (2), Porteirinha (1), Pouso Alegre (4), Presidente Olegário (2), Recreio (1), Ribeirão das Neves (6), Rio Pomba (1), Sabará (2), Santa Luzia (2), Santa Rita de Caldas (1), Santa Vitória (1), Santo Antônio do Itambé (1), Santo Antônio do Monte (1), São Gonçalo do Rio Abaixo (1), São Gonçalo do Sapucaí (1), São João Batista do Glória (1), São João del Rei (3), São Joaquim de Bicas (1), São Lourenço (1), São Pedro da União (1), Serro (1), Sete Lagoas (3), Taiobeiras (1), Tapira (1), Teófilo Otoni (4), Três Corações (2), Três Pontas (9), Tupaciguara (2), Ubá (1), Uberaba (12), Uberlândia (19), Unaí (2), Varginha (9), Vespasiano (1), Viçosa (1), Virgem da Lapa (1) e Visconde do Rio Branco (1); associadas ao vírus **Influenza A não subtipado** os municípios de Abaeté (1), Alfenas (2), Araguari (1), Arcos (1), Barbacena (1), Belo Horizonte (35), Boa Esperança (1), Bom Despacho (1), Bom Jesus do Amparo (1), Bom Sucesso (1), Brasília de Minas (1), Brumadinho (2), Caetanópolis (1), Campo Belo (2), Conselheiro Lafaiete (2), Contagem (7), Coromandel (3), Coronel Fabriciano (2), Curral de Dentro (1), Curvelo (1), Divinésia (1), Divinópolis (1), Extrema (2), Formiga (2), Frutal (5), Governador Valadares (1), Guarda-Mor (1), Guaxupé (4), Ibititê (1), Itabira (1), Itaguara (1), Itajubá (3), Itambé do Mato Dentro (1), Itapeverica (1), Itaú de Minas (1), Itaverava (1), Ituiutaba (2), Jacutinga (1), João Pinheiro (1), Juiz de Fora (3), Lagoa Santa (1), Lavras (6), Leopoldina (1), Manhuaçu (2), Mar de Espanha (1), Mariana (2), Martinho Campos (1), Matias Barbosa (1), Matipó (1), Matozinhos (1), Monte Santo de Minas (1), Montes Claros (4), Monte Sião (1), Morada Nova de Minas (1), Nepomuceno (1), Nova Lima (1), Novo Cruzeiro (1), Oliveira (2), Ouro Branco (1), Ouro Fino (1), Paraisópolis (1), Passos (1), Patos de Minas (4), Patrocínio (1), Pedro Leopoldo (1), Perdões (2), Piranguinho (1), Piraúba (1), Poços de Caldas (2), Pouso Alegre (1), Ribeirão das Neves (7), Rio Paranaíba (1), Santa Bárbara (1), Santa Luzia (2), Santa Rita de Caldas (1), Santa Vitória (1), São Geraldo (1), São Gotardo (1), São João del Rei (2), São Roque de Minas (1), São Sebastião do Paraíso (2), Sarzedo (1), Senador Amaral (1), Toledo (1), Três Corações (1), Tupaciguara (1), Uberaba (4), Uberlândia (13), Varginha (5), Vespasiano (1) e Viçosa (1), e associadas ao **vírus influenza B** os municípios de Astolfo Dutra (1), Barbacena (3), Belo Horizonte (3), Campanha (1), Cruzília (1), Formiga (1), Frutal (1), Ijaci (1), Lavras (1), Mateus Leme (2), Nepomuceno (1), Santa Bárbara (1), Santa Rita do Sapucaí (1), São Gonçalo do Pará (1), Uberaba (1) e Varginha (1); associada à **influenza por vínculo-epidemiológico** evidente, os municípios de Formiga (2) e Guaranésia (1).

Três pacientes tinham residência em municípios do estado de São Paulo - São Jose dos Campos (Influenza B),

Pirassununga (A/H1N1) e São Paulo (A/H1N1) – e foram atendidos em Paracatu, Barbacena e Belo Horizonte, respectivamente, 01 do Rio de Janeiro – Capital (A/H1N1) atendido em Barbacena e 01 de Rio Verde em Goiás (A/H1N1), atendido em Uberlândia.

Em todo o ano de 2015 Minas Gerais notificou 1.419 casos de SRAG a vigilância e naquele ano, 90 casos (6,3%) foram confirmadas como SRAG por influenza, predominando de 71,1% do vírus influenza A/H3 sazonal (64/90) entre os vírus pesquisados.

Perfil Epidemiológico dos Óbitos

Até a SE 35 de 2016 foram notificados 607 óbitos por SRAG, o que corresponde a 13,9 % (607/4378) do total de casos. Dos 607 óbitos notificados, 35,4% (215 /607) foram confirmadas para o vírus influenza, sendo 97,2% (209/ 215) decorrentes da influenza A e 1,4% (3/ 215) da influenza B. Dos óbitos relacionados a influenza, 71,3% (149/ 215) foram associados ao subtipo A/(H1N1) e 28,7% (60/ 215) a influenza A não subtipado (Figura 3 e Anexo 1). Os municípios com o maior número de óbitos associados à influenza no estado são Belo Horizonte (22/206), Contagem (7/206), Uberlândia (7/206) e Campo Belo (7/206), de pacientes residentes. Demais óbitos aconteceram em residentes de 15 municípios do estado, sendo, sendo associados ao **subtipo A/(H1N1)** os municípios de Aimorés (1), Alpinópolis (1), Andradas (2), Araxá (1), Areado (1), Astolfo Dutra (1), Barão de Cocais (1), Barbacena (1), Belo Horizonte (16), Betim (2), Bom Despacho (1), Brasília de Minas (1), Campanha (2), Campo Belo (5), Campos Gerais (1), Capitólio (1), Cataguases (1), Cipotânea (1), Conceição das Alagoas (1), Conselheiro Lafaiete (2), Contagem (5), Coromandel (3), Cruzília (1), Curvelo (1), Diamantina (1), Divinópolis (2), Dolores do Indaiá (2), Elói Mendes (1), Esmeraldas (1), Extrema (1), Felixlândia (1), Formiga (1), Frutal (2), Funilândia (1), Gouveia (1), Guanhães (1), Guaxupé (1), Ibiá (2), Ibité (1), Itabira (1), Itambacuri (1), Itapeverica (3), Itaúna (1), Juatuba (1), Juiz de Fora (3), Ladainha (1), Lagoa da Prata (1), Lavras (2), Leopoldina (1), Liberdade (1), Mariana (1), Mateus Leme (1), Monsenhor Paulo (1), Monte Santo de Minas (2), Montes Claros (1), Muriaé (2), Nepomuceno (1), Novo Cruzeiro (1), Ouro Fino (1), Paracatu (1), Pará de Minas (2), Paraguaçu (2), Passos (1), Patrocínio (2), Piranguçu (1), Piranguinho (1), Poços de Caldas (1), Ponte Nova (2), Pouso Alegre (1), Recreio (1), Ribeirão das Neves (2), Santa Luzia (1), Santa Vitória (1), Santo Antônio do Itambé (1), Santo Antônio do Monte (1), São Gonçalo do Rio Abaixo (1), São Gonçalo do Sapucaí (1), São Joaquim de Bicas (1), São Lourenço (1), São Pedro da União (1), Serro (1), Sete Lagoas (1), Taiobeiras (1), Teófilo Otoni (3), Três Pontas (3), Tupaciguara (1), Ubá (1), Uberaba (3), Uberlândia (7), Unaí (1) e Varginha (1); associados ao vírus **Influenza A não subtipado** os municípios de Alfenas (1), Araguari (1), Arcos (1), Barbacena (1), Belo Horizonte (5), Bom Despacho (1), Brumadinho (2), Campo Belo (2), Conselheiro Lafaiete (2), Contagem (2), Coromandel (1), Divinésia (1), Formiga (2), Guaxupé (2), Itabira (1), Ituiutaba (1), Juiz de Fora (1), Lavras (1), Manhuaçu (1), Mar de Espanha (1), Mariana (1), Martinho Campos (1), Matozinhos (1), Montes Claros (1), Morada Nova de Minas (1), Nepomuceno (1), Oliveira (2), Ouro Branco (1), Piraúba (1), Poços de Caldas (1), Ribeirão das Neves (3), Santa Luzia (2), Santa Rita de Caldas (1), Santa Vitória (1), São Geraldo (1), São Gotardo (1), São Roque de Minas (1), Senador Amaral (1), Toledo (1), Uberaba (1), Uberlândia (2), Varginha (3), Viçosa (1); associados ao **vírus influenza B** os municípios Astolfo Dutra (1), Mateus Leme (1), associado à **influenza por vínculo-epidemiológico** evidente, os município de Formiga (2) e Guaranésia (1).

Um paciente que tinha residência no município de São José dos Campos, atendido em Paracatu teve óbito associado ao vírus Influenza B. E outro paciente residente em São Paulo, atendido em Belo Horizonte teve óbito associado ao vírus Influenza (A/H1N1), ambos do Estado de São Paulo.

Minas Gerais




Figura 4. Distribuição dos óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave segundo agente etiológico e semana epidemiológica do início dos sintomas. Minas Gerais, 2016 até a SE 35 .

Entre os óbitos por influenza, a mediana da idade foi de 55 anos, variando de 09 a 92 anos. A taxa de mortalidade por influenza em Minas Gerais está em 1,03/100.000 habitantes. Dos 215 indivíduos que foram a óbito por influenza, 157 (73,0%) apresentaram pelo menos um fator de risco para complicação, com destaque para adultos ≥ 60 anos, cardiopatas e portadores de outros fatores de risco (Tabela 1). Além disso, 1 (5,6%) fizeram uso de antiviral dentro das 48 horas recomendáveis entre os primeiros sintomas e o início do tratamento, contudo essa não é a realidade da maioria. Recomenda-se iniciar o tratamento nas primeiras 48 horas.

Tabela 2 – Distribuição dos casos e óbitos de SRAG por influenza segundo fator de risco, vacinação e utilização de antiviral, Minas Gerais, 2016.

Fatores de Risco	SRAG por influenza (n=601)		Óbito por influenza (n=215)	
	n	%	n	%
SRAG por Influenza	410	68,2	157	73,0
Adultos ≥ 60 anos	152	25,3	68	31,6
Outros fatores de risco	113	18,8	37	17,2
Doença Cardiovascular Crônica	116	19,3	44	20,5
Pneumopatias Crônicas	92	15,3	37	17,2
Obesidade	48	8,0	26	12,1
Crianças < 2 anos	34	5,7	4	1,9
Diabetes Mellitus	67	11,1	31	14,4
Doença Neurológica Crônica	31	5,2	14	6,5
Imunodeficiência/Imunodepressão	22	3,7	10	4,7
Doença Renal Crônica	18	3,0	6	2,8
Gestante	0	0,0	0	0,0
Puerpério (até 42 dias do parto)	2	0,3	1	0,5
Doença Hepática Crônica	9	1,5	3	1,4
Síndrome de Down	5	0,8	2	0,9
Indígena	1	0,2	0	0,0
Que utilizaram antiviral em até 48 horas	146	24,3	35	16,3

Fonte: SINAN Influenza on line

(1) Dados parciais sujeitos a alteração/revisão

* Considerando população alvo para vacinação. Informação ignorada em 32% (131 de 410) dos casos confirmados e 34,4% (54 de 157) dos óbitos de influenza.

No ano de 2015 em Minas Gerais foram notificados 188 óbitos de SRAG a vigilância, sendo 15 óbitos (8,0%) associados ao vírus influenza. Dentre os óbitos por influenza, predominou o vírus influenza A/H3 sazonal com 60,0% (9/15) dos óbitos de SRAG por influenza.

LABORATÓRIO

A partir da semana epidemiológica 13 a FUNED passou a ter um aumento expressivo de amostras para pesquisa diagnóstica de casos de SRAG (146 amostras), este aumento pode ser identificado abaixo (figura 4), que traz a distribuição das amostras cadastradas no sistema de gerenciamento de amostras laboratoriais – GAL por semana epidemiológica, sendo que nas últimas semanas o aumento tem se destacado. Existem ainda muitas amostras em análise e nas próximas semanas, diante do volume de amostras muitos casos poderão ser laboratorialmente associados à influenza em outros municípios do estado.

Devido à grande demanda do laboratório de Virologia da Funed, há amostras pendentes desde a semana 15 e seus resultados liberados gradativamente, porém sem data prevista. Já as amostras que forem chegando recentemente poderão ter seus resultados liberados antes mesmo dessas amostras antigas.




Figura 5. Distribuição das amostras para pesquisa de influenza por situação registrada no sistema GAL, Minas Gerais, 2016 até a SE 35 .

RECOMENDAÇÕES ÀS REGIONAIS DE SAÚDE E SECRETARIAS DE SAÚDE MUNICIPAIS

- Disseminar aos serviços de saúde públicos e privados o Protocolo de Tratamento de Influenza- 2015 (ainda vigente), com ênfase no tratamento oportuno dos casos de SRAG e de SG com condições e fatores de risco;
- Divulgar amplamente à população as medidas preventivas contra a transmissão do vírus influenza (etiqueta respiratória e lavagem das mãos) e informações sobre a doença, com a orientação de busca de atendimento médico em caso de sinais e sintomas compatíveis;
- Em casos de surtos, realizar quimioprofilaxia nos grupos que vivem e/ou trabalham em instituições fechadas ou de longa permanência, com especial atenção para pessoas com condição ou fator de risco;
- Notificar todos os casos e óbitos suspeitos que atendam a definição de caso de SRAG no sistema SINAN Influenza Web, independente de coleta ou resultado laboratorial.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Boletins Epidemiológicos de Influenza no site da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS):
<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/situacao-epidemiologica-dados-influenza>
- Protocolo de Tratamento de Influenza - 2015:
<http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/dezembro/17/protocolo-influenza2015-16dez15-isbn.pdf>
- Síndrome Gripal/SRAG – Classificação de Risco e Manejo do Paciente:
http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/cartazes/sindrome_gripal_classificacao_risco_manejo.pdf
- Informe Técnico sobre o vírus Influenza A (H7N9):
<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/influenza-a-h7n9>
- Informações sobre o Coronavírus:
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10884&Itemid=638
- Nota Informativa sobre o Coronavírus Associado à Síndrome Respiratória do Oriente Médio – MERS-CoV: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/638-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/coronavirus/13752-mers-cov>
- Nota Informativa e Recomendações Sobre a Sazonalidade da Influenza 2016 -
<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/414-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/influenza/22873-informacoes-sobre-gripe>
- Informe Regional de Influenza – Organização Panamericana da Saúde/OMS:
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3352&Itemid=2469&to=2246&lang=es
- Curso de atualização para manejo clínico de influenza: <http://www.unasus.gov.br/influenza>
- Cartaz Instruções para diluição do Oseltamivir (Tamiflu®) a partir da cápsula de 75 mg para administração a crianças:
http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/folder/instrucoes_diluicao_oseltamivir_tamiflu_crianças.pdf
- Vídeo (Youtube) com Instruções de diluição do Tamiflu para administração a crianças:
<https://www.youtube.com/watch?v=VBDPIkdceg4>

ANEXOS


Anexo 1. Distribuição dos casos e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave segundo região, Macrorregião de Saúde de residência e agente etiológico.

Minas Gerais, 2016 até a SE 35.

Regiões de Saúde	SRAG		SRAG confirmado para influenza										SRAG por outros vírus respiratórios		SRAG por outros agentes etiológicos		SRAG não especificada		SRAG em investigação	
	Influenza A(H1N1)pdm09		Influenza A/H1 sazonal		Influenza A/H3 sazonal		Influenza A não subtipado		Influenza B		Sem Informação									
Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos	
Sul	531	100	95	33	-	-	-	-	44	13	7	-	1	1	4	-	6	-	133	31
Alfenas	54	18	10	6	-	-	-	-	6	3	-	-	1	1	-	-	-	-	13	6
Passos	42	7	8	5	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	3	-	7	-
Pouso Alegre	183	33	28	8	-	-	-	-	16	4	1	-	-	-	3	-	3	-	65	14
Varginha	252	42	49	14	-	-	-	-	16	5	6	-	-	-	1	-	-	-	48	11
Centro Sul	143	30	14	4	-	-	-	-	7	4	3	-	-	-	1	-	-	-	43	7
Barbacena	109	28	11	4	-	-	-	-	5	4	3	-	-	-	1	-	-	-	26	5
São João Del Rei	36	2	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	2
Centro	2 504	229	106	40	-	-	-	-	70	18	6	1	2	-	6	2	49	3	384	68
Belo Horizonte	2 299	204	89	32	-	-	-	-	62	16	5	1	2	-	5	2	33	2	343	60
Itabira	77	9	7	4	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	1	-	1	-	19	2
Sete Lagoas	128	16	10	4	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	15	1	22	6
Jequitinhonha	22	5	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Diamantina	22	5	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Oeste	231	48	33	19	-	-	-	-	13	9	2	-	2	2	2	1	-	-	31	2
Divinópolis	229	48	32	19	-	-	-	-	12	9	2	-	2	2	2	1	-	-	31	2
Leste	63	5	4	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	18	3
Coronel Fabriciano	43	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2
Governador Valadares	20	2	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1
Sudeste	180	37	19	11	-	-	-	-	9	5	1	1	-	-	-	-	5	1	55	12
Juiz de Fora	94	10	8	4	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	30	2
Leopoldina	27	8	6	4	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	8	-
Ubá	48	19	5	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	5	1	17	10
Norte	51	13	8	3	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3
Januária	13	4	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Montes Claros	35	9	6	2	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2
Pirapora	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Noroeste	95	13	12	2	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	5	1	25	8
Patos de Minas	75	10	7	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	1	1	23	7
Unaí	20	3	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	1
Leste do Sul	48	8	5	2	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-	14	2
Manhumirim	25	4	2	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Ponte Nova	34	4	3	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	12	1
Nordeste	70	21	9	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	7	1
Pedra Azul	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Teófilo Otoni	64	18	8	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	6	1
Triângulo do Sul	192	37	33	9	-	-	-	-	9	1	2	-	1	-	5	3	3	2	53	9
Uberaba	192	37	33	9	-	-	-	-	9	1	2	-	1	-	5	3	3	2	53	9
Triângulo do Norte	231	56	30	14	-	-	-	-	22	6	-	-	-	-	-	-	-	-	66	19
Ituiutaba	17	7	2	1	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3
Uberlândia	214	49	28	13	-	-	-	-	19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	61	16
Outros Estados	17	5	4	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	2
MINAS GERAIS	4 378	607	377	149	-	-	-	-	196	60	22	3	6	3	19	7	72	7	845	167

Fonte: SINAN Influenza Web. Dados atualizados em 06/09/2016, sujeitos a alteração/revisão.

Anexo 2. Distribuição espacial dos casos e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave confirmados para influenza por município de residência. Minas Gerais, 2016 até a SE 35



Fonte: SINAN Influenza Web. Dados atualizados em 06/09/2016, sujeitos a alteração.

* O círculo é proporcional ao número de casos e óbitos.