



Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais
Subsecretaria de Vigilância e Proteção a Saúde
Superintendência de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador
Programa Estadual de Controle das Doenças Transmitidas pelo Aedes

Boletim epidemiológico de monitoramento dos casos de Dengue,

Febre Chikungunya e Febre Zika.

Nº 68, Semana Epidemiológica 31

Data da atualização: 31/07/2017

1- Dengue

1.1 –Distribuição dos casos

Em 2017, até o dia 31/07, foram registrados **25.736** casos prováveis de dengue (Tabela 01).

Tabela 01: Casos prováveis* de dengue por mês de início de sintomas, 2010 a 2017, MG.

Mês	Ano de início dos sintomas								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Janeiro	14.470	3.812	2.342	35.519	5.016	7.075	57.901	5.086	
Fevereiro	29.488	5.659	2.599	62.557	8.576	9.339	138.524	4.875	
Março	55.309	7.350	3.887	146.925	11.294	27.853	158.624	5.856	
Abril	62.406	8.662	4.753	123.965	15.335	59.992	122.335	4.244	
Maio	38.813	6.914	3.848	31.309	9.815	51.245	36.399	3.267	
Junho	6.398	1.690	2525	7.232	3.496	14.198	4.752	1.885	
Julho	1.682	655	1.221	1.654	1.116	3.305	1.010	523	
Agosto	611	419	650	673	552	1.226	627		
Setembro	493	399	532	577	653	979	628		
Outubro	419	504	659	744	643	1.313	745		
Novembro	811	880	1.162	1.056	874	3.824	1.208		
Dezembro	1.651	1.365	6.356	2.526	1.101	14.533	1.847		
Total	212.551	38.309	30.534	414.737	58.471	194.882	524.600	25.736	


Fonte: SINAN-ONLINE/SES-MG - Acesso em: 31/07/2017

*Casos prováveis são os casos confirmados e suspeitos

O número de casos prováveis de dengue em 2017 acompanha o mesmo perfil de anos não epidêmicos anteriores, como pode ser visualizado na figura 1. Nesta figura os anos epidêmicos foram excluídos para fins de comparação com objetivo de não levar a um viés de interpretação dos dados. O pico de ocorrência de casos ocorre entre as semanas epidemiológicas 14 e 17 que corresponde aos meses de março e abril (Figura 01).



Figura 01: Casos prováveis de dengue por semana epidemiológica de início de sintomas excluídos os anos epidêmicos, MG.



Fonte: SINAN-ONLINE/SES-MG - Acesso em: 31/07/2017

1.1.1 – Distribuição de casos prováveis de dengue Município

Nas quatro últimas semanas epidemiológicas (25/06/2017 a 22/07/2017) nenhum município se encontra em alta incidência de casos prováveis de dengue; quatro municípios estão com média incidência (Tabela 02) e 120 municípios com baixa incidência (Figura 3).

Tabela 02: Municípios com alta e média incidência de casos prováveis de dengue nas quatro últimas semanas epidemiológicas de sintomas, MG.


URS	Município	Casos Prováveis	População*	Incidência
Coronel Fabriciano	Jaguaraçu	6	3.136	191,33
Januária	Japonvar	11	8.643	127,27
Januária	Campo Azul	4	3.843	104,09
Diamantina	Leme do Prado	5	4.983	100,34

Fonte: SINAN-ONLINE/SES-MG - Acesso em: 31/07/2017

* População estimada 2015




Figura 02: Incidência acumulada de casos prováveis de dengue por município de residência no ano de 2017, MG.



Fonte: SINAN-ONLINE/SES-MG - Acesso em: 31/07/2017

Figura 03: Incidência de casos prováveis de dengue nas últimas quatro semanas epidemiológicas por município de residência, 2017, MG.



Legenda:

- ☐ Sem casos prováveis de dengue
- ☒ Incidência baixa – menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes
- ☒ Incidência média – 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes
- ☒ Incidência alta – mais de 300 casos prováveis por 100.000 habitantes

1.2 – Distribuição dos Óbitos

Em 2017 foram confirmados 13 óbitos por dengue. Os óbitos são residentes nos municípios: Araguari, Arinos, Bocaiúva, Campim Branco, Ibitité, Leopoldina, Medina, Monsenhor Paulo, Patos de Minas, Ribeirão das Neves, São José do Divino, Uberaba e Uberlândia. Não existe uma faixa etária predominante; a mediana de idade foi de 53 anos (3 a 93 anos).

Além desses, o Estado possui outros 13 óbitos que estão em investigação.


2- Febre Chikungunya

2.1- Distribuição dos casos

Minas Gerais está em situação de alerta para chikungunya. O número de casos prováveis de chikungunya superou muito o número registrado em anos anteriores (Tabela 03) e ultrapassou o número de casos prováveis de dengue nas semanas epidemiológicas 9 a 14. (Figura 04).



Figura 04: Casos prováveis de dengue e chikungunya, MG, 2017.



Fonte: SES/MG/SINAN – Acesso em: 31/07/2017

Em 2017, até o momento, foram noticiados **17.973** casos prováveis de chikungunya (Tabela 03). Deste total de casos prováveis, 110 são gestantes e 41 são confirmadas para chikungunya pelo critério laboratorial. Em 2016, foram confirmados os primeiros casos autóctones de chikungunya. Até 2015 todos os casos notificados eram casos importados de outros estados ou de outro país.

Tabela 03: Casos prováveis de febre chikungunya, por mês de início de sintomas, 2014 – 2017, MG.

Mês	Ano de início dos sintomas			
	2014	2015	2016	2017
Janeiro	0	1	34	744
Fevereiro	0	1	78	3.436
Março	0	0	89	7.805
Abril	0	2	88	3.677
Maio	0	1	84	1.262
Junho	0	0	22	853
Julho	0	2	16	196
Agosto	1	0	7	
Setembro	1	1	9	
Outubro	5	4	7	
Novembro	8	3	25	
Dezembro	3	16	44	
Total	18	31	503	17.973

Fonte: SES/MG/SINAN – Acesso em: 31/07/2017

Nas últimas quatro semanas (25/06/2017 a 22/07/2017), o estado de Minas Gerais apresentou um município com alta incidência de casos prováveis de chikungunya e dois com média incidência (Tabela 04). Os casos prováveis de chikungunya estão concentrados nas regionais de saúde de Governador Valadares, Teófilo Otoni e Pedra Azul (Figura 05 e 06).




Tabela 04: Municípios com alta e média incidência de casos prováveis de chikungunya nas quatro últimas semanas epidemiológicas, MG.

URS	Município	Casos Prováveis	População*	Incidência
Pedra Azul	Salto da Divisa	34	7.107	478,40
G. Valadares	Tumiritinga	10	6.669	149,95
Coronel Fabriciano	Coronel Fabriciano	120	109.363	109,73

Fonte: SINAN-ONLINE/SES-MG - Acesso em: 31/07/2017


* População estimada 2015

Figura 05: Incidência de casos prováveis de chikungunya por município de residência no ano de 2017, MG.



Fonte: SINAN-ONLINE/SES-MG – Acesso em: 31/07/2017

Figura 06: Incidência de casos prováveis de chikungunya nas últimas quatro semanas epidemiológicas por município de residência, 2017, MG.



Legenda:

- Sem casos prováveis de chikungunya
- Incidência baixa – menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes
- Incidência média – 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes
- Incidência alta – mais de 300 casos prováveis por 100.000 habitantes

2.2 - Distribuição dos Óbitos

Em 2017, o estado de Minas Gerais confirmou cinco óbitos por chikungunya do município de Governador Valadares, em todos os casos há presença de comorbidades. Os óbitos apresentaram faixa etária acima dos 65 anos; a mediana de idade foi de 75 anos (66 a 88 anos). Estes óbitos ocorreram no primeiro trimestre do ano, coincidindo com o período de maior número de casos. Além desses, o Estado possui outros 16 óbitos que estão em investigação.



3- Zika Vírus

3.1 – Distribuição dos casos

Em 2017 foram registrados **765** casos prováveis de zika, sendo 122 em gestantes, desse total 57 gestantes foram confirmadas para zika pelo critério laboratorial. O número de casos prováveis em 2017 está muito inferior ao número de casos prováveis notificados em 2016 (Tabela 05).

Tabela 05: Casos prováveis de zika vírus por mês de início de sintomas, 2016-2017, MG*.

Mês	Ano de início dos sintomas	
	2016	2017
Janeiro	742	106
Fevereiro	4.945	131
Março	4.975	212
Abril	2.214	111
Maio	833	112
Junho	153	78
Julho	32	15
Agosto	20	
Setembro	33	
Outubro	30	
Novembro	55	
Dezembro	54	
Total	14.086	765


Fonte: SINAN/SES/MG – Acesso em: 31/07/2017

*Casos suspeitos que apresentam exantema máculopapular pruriginoso com pelo menos mais dois sintomas. Exceto os casos de recém nascido (RN) com microcefalia.

Em 2017 foram notificados casos prováveis de zika em 85 municípios. Destaca-se o município de Ibiracatu na regional de saúde de Januária e o município de Aimorés na regional de Governador Valadares com **alta** incidência de casos prováveis; os municípios de Tumiritinga, Resplendor (URS Governador Valadares) e Medina (URS Pedra Azul) com **média** incidência de casos (Figura 07). Casos prováveis de zika em gestantes foram notificados em 40 municípios de Minas Gerais, com destaque para: Aimorés (15 gestantes), Governador Valadares (13 gestantes), Uberlândia (10 gestantes), Belo Horizonte, Betim e Ituiutaba (9 gestantes).



Figura 07: Incidência acumulada de casos prováveis de zika por município de residência no de 2017, MG.



Fonte: SINAN/SES-MG – Acesso em: 31/07/2017

Legenda:

- ☐ Sem casos prováveis de zika
- ☒ Incidência baixa – menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes
- ☒ Incidência média – 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes
- ☒ Incidência alta – mais de 300 casos prováveis por 100.000 habitantes

4 - Vigilância laboratorial

Este ano, três sorotipos do vírus (DENV1, DENV2 e DENV3) foram identificados no Estado. Apenas nove regionais de saúde tiveram identificação do sorotipo circulante. O sorotipo DENV1 foi identificado nas regionais: Belo Horizonte, Januária, Patos de Minas, Teófilo Otoni e Varginha; o sorotipo DENV2 em Uberaba, Uberlândia; o sorotipo DENV3 em Montes Claros e circulação simultânea dos sorotipos DENV2 e DENV3 na regional de Unaí.

5- Levantamento Rápido do Índice de Infestação por *Aedes aegypti* - LIRAA

LIRAA é o mapeamento rápido dos índices de infestação por *Aedes aegypti*. Permite a identificação dos criadouros predominantes e a situação de infestação do município. Índices até 1% indicam condições satisfatórias, entre 1% e 3,9%, situação de alerta e índices superiores a 4%, risco de surto.

Em outubro de 2016 o LIRAA foi realizado em 137 municípios de Minas Gerais. Sete municípios apresentaram índices de infestação predial (IIP) superiores a 3,9%, ou seja, estavam em situação de risco para ocorrência de surto (Figura 08).

Em janeiro de 2017, 29 municípios estavam em situação de risco para ocorrência de surto e 78 estão em situação de alerta (Figura 09).

Em março de 2017, o LIRAA foi realizado em 150 municípios, sendo que 58 estão com em situação de risco para ocorrência de surto, 68 em situação de alerta e 24 com baixo risco para ocorrência de surtos (Figura 10).



Figura 08: LIRAA por município, MG, out/2016




Figura 09: LIRAA por município, MG, jan/2017





Figura 10: LIRAA por município, MG, março/2017



Fonte: SES/MG. Atualizado em 10/04/2017

Legenda:

- Município que não realiza Liraa ou sem risco
- Município com baixo risco
- Município com médio risco
- Município com alto risco