

Dengue

Distribuição dos casos

Em 2017, até o dia 02/10, foram registrados **26.083** casos prováveis de dengue.


Tabela: Casos prováveis* de dengue por mês de início de sintomas, 2010 a 2017, MG.

Mês	Ano de início dos sintomas							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Janeiro	14.470	3.812	2.342	35.519	5.008	7.056	57.752	4.954
Fevereiro	29.488	5.659	2.599	62.559	8.575	9.310	137.870	4.752
Março	55.307	7.348	3.885	146.920	11.287	27.788	157.481	5.589
Abril	62.401	8.661	4.753	123.957	15.330	59.861	121.460	3.897
Maiο	38.812	6.914	3.848	31.306	9.811	51.069	36.198	3.050
Junho	6.398	1.690	2.525	7.230	3.496	14.086	4.730	1.590
Julho	1.682	655	1.221	1.654	1.115	3.285	1.000	696
Agosto	611	419	650	673	551	1.214	613	806
Setembro	493	399	532	577	652	957	634	749
Outubro	419	504	659	744	641	1.292	732	
Novembro	811	880	1.162	1.056	873	3.792	1.172	
Dezembro	1.651	1.364	6.356	2.523	1.102	14.377	1.343	
Total	212.543	38.305	30.532	414.718	58.441	194.087	520.985	26.083

Fonte: SINAN-ONLINE/SES-MG - Acesso em: 02/10/2017

*Casos prováveis são os casos confirmados e suspeitos

Figura: Incidência acumulada de casos prováveis de dengue por município de residência no ano de 2017, MG.



Fonte: SINAN-ONLINE/SES-MG - Acesso em: 02/10/2017

Legenda:

 Sem casos prováveis de dengue

 Incidência baixa – menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes

 Incidência média – 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes

 Incidência alta – mais de 300 casos prováveis por 100.000 habitantes

Distribuição dos Óbitos

Em 2017 foram confirmados 13 óbitos por dengue. Os óbitos são residentes nos municípios: Araguari, Arinos, Bocaiúva, Campim Branco, Ibitité, Leopoldina, Medina, Monsenhor Paulo, Patos de Minas, Ribeirão das Neves, São José do Divino, Uberaba e Uberlândia. Não existe uma faixa etária predominante; a mediana de idade foi de 53 anos (3 a 93 anos).

Além desses, o Estado possui outros 15 óbitos que estão em investigação.

Febre Chikungunya

Distribuição dos casos

Em 2017, até o momento, foram noticiados **17.548** casos prováveis de chikungunya. Deste total de casos prováveis, 112 são gestantes e 54 foram confirmadas para chikungunya pelo critério laboratorial. Em 2016, foram confirmados os primeiros casos autóctones de chikungunya. Até 2015 todos os casos notificados eram casos importados de outros estados ou de outro país.


Tabela: Casos prováveis de febre chikungunya, por mês de início de sintomas, 2014 – 2017, MG.

Mês	Ano de início dos sintomas			
	2014	2015	2016	2017
Janeiro	0	1	34	701
Fevereiro	0	1	78	3.027
Março	0	0	89	7.164
Abril	0	2	88	3.644
Maio	0	1	84	1.269
Junho	0	0	22	975
Julho	0	2	16	494
Agosto	1	0	7	191
Setembro	1	1	9	83
Outubro	5	4	7	
Novembro	8	3	25	
Dezembro	3	16	44	
Total	18	31	503	17.548

Fonte: SES/MG/SINAN – Acesso em: 02/10/2017

Os casos prováveis de chikungunya estão concentrados nas regionais de saúde de Governador Valadares, Teófilo Otoni, Pedra Azul e Coronel Fabriciano.

Figura: Incidência de casos prováveis de chikungunya por município de residência no ano de 2017, MG.



Fonte: SINAN-ONLINE/SES-MG – Acesso em: 02/10/2017

Legenda:

- Sem casos prováveis de chikungunya
- Incidência baixa – menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes
- Incidência média – 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes
- Incidência alta – mais de 300 casos prováveis por 100.000 habitantes

Distribuição dos Óbitos

Em 2017, o estado de Minas Gerais confirmou **7 (sete) óbitos** por Chikungunya, seis no município de Governador Valadares e um no município de Teófilo Otoni; em todos os casos há presença de comorbidades. Os óbitos apresentaram faixa etária acima dos 65 anos; a mediana de idade foi de 77 anos (66 a 96 anos). **Estes óbitos ocorreram no primeiro trimestre do ano, coincidindo com o período de maior número de casos.**

Além desses, o Estado possui outros 15 óbitos que estão em investigação.

Zika Vírus

Distribuição dos casos

Em 2017 foram registrados **708** casos prováveis de zika, sendo 124 em gestantes.

Tabela: Casos prováveis de zika vírus por mês de início de sintomas, 2016-2017, MG*.


Mês	Ano de início dos sintomas	
	2016	2017
Janeiro	742	99
Fevereiro	4.945	126
Março	4.975	197
Abril	2.214	95
Maio	833	85
Junho	153	53
Julho	32	15
Agosto	20	18

Setembro	33	20
Outubro	30	
Novembro	55	
Dezembro	54	
Total	14.086	708

Fonte: SINAN/SES/MG – Acesso em: 02/10/2017

*Casos suspeitos que apresentam exantema máculopapular pruriginoso com pelo menos mais dois sintomas. Exceto os casos de recém nascido (RN) com microcefalia.

Figura: Incidência acumulada de casos prováveis de zika por município de residência no de 2017, MG.



Fonte: SINAN/SES-MG – Acesso em: 02/10/2017

Legenda:

- Sem casos prováveis de zika
- Incidência baixa – menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes
- Incidência média – 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes
- Incidência alta – mais de 300 casos prováveis por 100.000 habitantes

Levantamento Rápido do Índice de Infestação por *Aedes aegypti* - LIRAA


LIRAA é o mapeamento rápido dos índices de infestação por *Aedes aegypti*. Permite a identificação dos criadouros predominantes e a situação de infestação do município. Índices até 1% indicam condições satisfatórias, entre 1% e 3,9%, situação de alerta e índices superiores a 4%, risco de surto.

Em outubro de 2016 o LIRAA foi realizado em 137 municípios de Minas Gerais. Sete municípios apresentaram índices de infestação predial (IIP) superiores a 3,9%, ou seja, estavam em situação de risco para ocorrência de surto.


Em janeiro de 2017, 29 municípios estavam em situação de risco para ocorrência de surto e 78 estão em situação de alerta.

Em março de 2017, o LIRAA foi realizado em 150 municípios, sendo que 58 estão com em situação de risco para ocorrência de surto, 68 em situação de alerta e 24 com baixo risco para ocorrência de surtos


LIRAA por município, MG, out/2016



LIRAA por município, MG, jan/2017



LIRAA por município, MG, março/2017



Fonte: SES/MG. Atualizado em 10/04/2017

Legenda:

- Município que não realiza Liraa ou sem risco
- Município com baixo risco
- Município com médio risco
- Município com alto risco