



Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais
Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde
Programa Estadual de Controle das Doenças Transmitidas pelo *Aedes*

**Boletim epidemiológico de monitoramento dos casos de
Dengue, Chikungunya e Zika.**

Nº 107, Semana Epidemiológica 33

Data da atualização: 13/08/2018

1- Dengue

Distribuição dos casos

Em 2018, até o dia 13/08, foram registrados **23.265** casos prováveis de dengue (Tabela 1).

Tabela 1: Casos prováveis¹ de dengue por mês de início de sintomas, 2010 a 2018, MG.

Mês	Ano de início dos sintomas								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Janeiro	14.470	3.795	2.341	35.522	5.007	7.050	57.617	4.671	2.108 ²
Fevereiro	29.487	5.624	2.598	62.560	8.573	9.306	137.474	4.298	2.375
Março	55.292	7.346	3.885	146.917	11.286	27.773	156.923	5.207	4.579
Abril	62.392	8.659	4.752	123.956	15.334	59.857	120.895	3.677	7.002
Maiο	38.796	6.914	3.848	31.307	9.809	51.062	36.046	2.846	4.093
Junho	6.398	1.690	2.525	7.230	3.495	14.083	4.698	1.444	1.877
Julho	1.683	656	1.220	1.653	1.115	3.281	990	585	1.151
Agosto	611	419	650	673	551	1.214	597	486	80
Setembro	492	399	532	577	652	956	619	523	
Outubro	419	504	659	745	641	1.288	714	645	
Novembro	811	880	1.162	1.056	874	3.789	1.154	676	
Dezembro	1.651	1.364	6.356	2.523	1.098	14.334	1.323	889	
Total	212.502	38.250	30.528	414.719	58.435	193.993	519.050	25.947	23.265

Fonte: SINAN-ONLINE/SES-MG - Acesso em: 13/08/2018

¹Casos prováveis são os casos confirmados e suspeitos

²Os casos com início de sintomas no dia 31/12/2017, semana epidemiológica 1/2018, estão contabilizados no mês de janeiro de 2018.

1.1.1 – Distribuição de casos prováveis de dengue por município

Nas quatro últimas semanas epidemiológicas (08/07/2018 a 04/08/2018) **um** município encontra-se com incidência alta de casos prováveis de dengue, **quatro** municípios estão em média incidência (Tabela 2), nenhum município com incidência muito alta, 152 municípios estão com baixa incidência e 696 municípios estão sem registro de casos prováveis (Figura 2).




Tabela 2: Municípios com incidência de casos prováveis de dengue acima de 100 casos por 100 mil habitantes nas quatro últimas semanas epidemiológicas de sintomas, MG.

URS	Município	Casos Prováveis	População*	Incidência
Pirapora	Ponto Chique	18	4.212	427,35
Montes Claros	Gameleiras	8	5.255	152,24
Montes Claros	Guaraciama	7	4.962	141,07
Divinópolis	Araújos	10	8.768	114,05
Pirapora	Lassance	7	6.663	105,06

Fonte: SINAN-ONLINE/SES-MG - Acesso em: 13/08/2018


*População estimada 2015

Figura 1: Incidência acumulada de casos prováveis de dengue por município de residência no ano de 2018, MG.



Fonte: SINAN-ONLINE/SES-MG - Acesso em: 13/08/2018

Figura 2: Incidência de casos prováveis de dengue nas últimas quatro semanas epidemiológicas por município de residência, 2018, MG.



Legenda:

- Sem casos prováveis de dengue
- Incidência baixa – menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes
- Incidência média – 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes
- Incidência alta – 300 a 499 casos prováveis por 100.000 habitantes
- Incidência muito alta – mais de 500 casos prováveis por 100.000 habitantes

1.2 – Distribuição dos Óbitos

Em 2017 foram confirmados 19 óbitos por dengue. Os óbitos eram residentes nos municípios: Araguari, Arinos, Bocaiúva, Campim Branco, Conselheiro Pena, Curvelo, Divinópolis, Eloi Mendes, Ibitrité, Leopoldina, Medina, Monsenhor Paulo, Patos de Minas, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São José do Divino, Teófilo Otoni, Uberaba e Uberlândia.

Em 2018, até o momento, **sete** óbitos foram confirmados por dengue residentes nos municípios: Arcos, Conceição do Pará, Contagem, Ituiutaba, Lagoa da Prata, Moema e Uberaba; há nove óbitos em investigação para dengue.



2- Febre Chikungunya

Distribuição dos casos

Foram registrados **10.482** casos prováveis de chikungunya em 2018 (Tabela 3), **concentrados na região do Vale do Aço** (Figura 4). Deste total, 95 são gestantes, sendo que 32 foram confirmadas pelo critério laboratorial.

Até 2015 todos os casos eram importados. Os primeiros casos autóctones de chikungunya ocorreram em 2016. O ano com maior número de casos prováveis de chikungunya foi 2017. Os casos estavam concentrados nas Unidades Regionais de Saúde (URS's) de Governador Valadares, Teófilo Otoni, Pedra Azul e Coronel Fabriciano.

Tabela 3: Casos prováveis de febre chikungunya, por mês de início de sintomas, 2014 – 2018, MG.

Mês	Ano de início dos sintomas				
	2014	2015	2016	2017	2018
Janeiro	0	3	34	677	944 ¹
Fevereiro	0	1	78	2.757	778
Março	0	0	78	6.401	2.756
Abril	0	2	73	3.159	3.870
Maio	0	1	75	1.152	1.537
Junho	0	0	20	967	416
Julho	0	2	12	493	175
Agosto	1	0	5	188	6
Setembro	1	1	9	119	
Outubro	5	4	7	112	
Novembro	8	3	22	121	
Dezembro	3	16	40	175	
Total	18	33	453	16.321	10.482

Fonte: SES/MG/SINAN – Acesso em: 13/08/2018

¹ Os casos com início de sintomas no dia 31/12/2017, semana epidemiológica 1/2018, estão contabilizados no mês de janeiro de 2018.

Nas últimas quatro semanas (08/07/2018 a 04/08/2018), o estado de Minas Gerais apresentou **um** município em média incidência de casos prováveis de chikungunya, nenhum município com incidência muito alta e alta (Tabela 04), 28 municípios em baixa incidência e 824 estão sem registro de casos prováveis (Figura 5).



Figura 4: Incidência de casos prováveis de chikungunya por município de residência no ano de 2018, MG.





Figura 5: Incidência de casos prováveis de chikungunya nas últimas quatro semanas epidemiológicas por município de residência, 2018, MG.



Fonte: SINAN-ONLINE/SES-MG – Acesso em: 13/08/2018

Legenda:

- Sem casos prováveis de chikungunya
- Incidência baixa – menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes
- Incidência média – 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes
- Incidência alta – de 300 a 499 casos prováveis por 100.000 habitantes
- Incidência muito alta – mais de 500 casos prováveis por 100.000 habitantes

2.2 - Distribuição dos Óbitos

Em 2017, o estado de Minas Gerais confirmou 15 óbitos por chikungunya, 12 do município de Governador Valadares e um nos municípios de: Central de Minas, Ipatinga e Teófilo Otoni; em todos os casos há presença de comorbidades. Desse total, 13 óbitos apresentaram faixa etária acima dos 65 anos; a mediana de idade foi de 74,4 anos (38 a 96 anos). Os óbitos ocorreram, em sua maioria, no primeiro trimestre do ano, coincidindo com o período de maior número de casos.

Até o momento, foi confirmado um óbito por chikungunya no município de Coronel Fabriciano em 2018; há um óbito em investigação.

3- Zika Vírus

Distribuição dos casos

Foram registrados **177** casos prováveis de zika em 2018, sendo 44 em gestantes e destas nove com confirmação laboratorial (Tabela 5). Casos prováveis de zika em gestantes foram registrados em 21 municípios, destaca-se: Ipatinga (8 gestantes), Coronel Fabriciano (5 gestantes), Belo Horizonte e Uberlândia (4 gestantes cada), Janaúba e Santana do Paraíso (3 gestantes cada).



Tabela 5: Casos prováveis de zika vírus por mês de início de sintomas, 2016-2018, MG*.


Mês	Ano de início dos sintomas		
	2016	2017	2018
Janeiro	710	94	17
Fevereiro	4.704	119	28
Março	4.815	186	31
Abril	2.130	94	28
Maio	823	86	24
Junho	148	52	16
Julho	31	16	32
Agosto	17	7	1
Setembro	28	22	
Outubro	27	13	
Novembro	50	22	
Dezembro	44	12	
Total	13.527	723	177

Fonte: SINAN/SES/MG – Acesso em: 13/08/2018

*Casos suspeitos que apresentam exantema máculopapular pruriginoso com pelo menos mais dois sintomas. Exceto os casos de recém nascido (RN) com microcefalia.

Em 2018 foram notificados casos prováveis de zika em 57 municípios (Figura 7).

Figura 7: Incidência acumulada de casos prováveis de zika por município de residência no de 2018, MG.



Fonte: SINAN/SES-MG – Acesso em: 13/08/2018



5- Levantamento de infestação


O Levantamento de Índice Rápido para *Aedes aegypti* (LIRAA) e o Levantamento de Índice Amostral (LIA) foram desenvolvidos em 2002, para atender à necessidade dos gestores e profissionais que operacionalizam o controle das arboviroses de dispor de informações entomológicas em um ponto no tempo (antes do início do verão) antecedendo o período de maior transmissão, com vistas ao fortalecimento das ações de combate vetorial nas áreas de maior risco. Trata-se, fundamentalmente, de um método de amostragem que tem como objetivo principal a obtenção de indicadores entomológicos, de maneira rápida. O LIRAA/LIA são métodos de amostragem e mapeamento dos índices de infestação por *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*. Estes levantamentos permitem a identificação dos criadouros predominantes e a situação de infestação dos municípios que o realizaram. Os índices até 0,9% indicam condições satisfatórias, entre 1% e 3,9%, situação de alerta e índices superiores a 4%, risco de surto.

No levantamento de índice realizado no mês de abril (dados finais), 840 municípios enviaram informações, dos quais: **112** estão em situação de **risco para ocorrência de surto**, 388 estão em situação de alerta e 340 em situação satisfatória (Figura 9).

A figura 10 demonstra os recipientes predominantes como potenciais criadouros do *Aedes aegypti* ou *Aedes albopictus* nos municípios. São classificados em cinco grupos: Grupo A – depósitos para armazenamento de água; Grupo B – depósitos móveis; Grupo C – depósitos fixos; Grupo D – depósitos passíveis de remoção; Grupo E – depósitos naturais. Essa classificação permite, de certa forma, conhecer a importância entomológica e as consequentes repercussões epidemiológicas desses recipientes, sem, no entanto, fornecer informações sobre a sua produtividade e a estratégia de direcionamento das ações de controle vetorial nos municípios que realizaram o monitoramento entomológico.

Os depósitos de água (grupo A) foram identificados como criadouros predominantes, seguido pelos pequenos depósitos móveis (grupo B) e o lixo (recipientes plásticos, latas), sucatas em pátios e ferro velhos, entulhos (grupo D2).


Figura 9: Índice de infestação predial, abril 2018, MG.



Fonte: PECDTA/SubVPS/SES-MG – Atualização: 29/06/2018



Figura 10: Criadouros predominantes, abril 2018, MG.



Fonte: PECDTA/SubVPS/SES-MG – Atualização: 29/06/2018