

1 CASOS DE TUBERCULOSE EM MINAS GERAIS, 2020



Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Dados sujeitos a alteração;

- TOTAL DE CASOS: Casos notificados de tuberculose de todas as formas;
- CASOS NOVOS: Casos de tuberculose ativa que nunca utilizaram medicamento antituberculoso ou que utilizaram por menos de 30 dias;
- REINGRESSOS: Casos de recidiva após cura e reingresso após abandono. Recidivas são casos de tuberculose ativa que foram tratados anteriormente e receberam alta por cura comprovada ou por terem completado o tratamento. Reingressos após abandono são casos de tuberculose ativa, tratados anteriormente por mais de 30 dias, mas que deixaram de tomar os medicamentos por 30 dias consecutivos ou mais.


Todas as 28 Unidades Regionais de Saúde (URS) notificaram casos de tuberculose em 2020, sendo as três URS com maior número de notificações:

Belo Horizonte (1.114), Juiz de Fora (319) e Uberlândia (206)

Esses números correspondem a **41,6%** dos casos novos diagnosticados no estado em 2020.

2 INCIDÊNCIA E MORTALIDADE


Coeficiente de **INCIDÊNCIA** de tuberculose por Unidade Regional de Saúde, 2020



Fontes: Sinan; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dados sujeitos a alteração;

Coeficiente de incidência: número de casos novos de tuberculose a cada 100 mil habitantes.

Coeficiente de **MORTALIDADE** por tuberculose, por Unidade Regional de Saúde, 2019




Fontes: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM); IBGE. Dados sujeitos a alteração;

Coeficiente de mortalidade: número de óbitos por tuberculose a cada 100 mil habitantes.

3

PROPORÇÃO DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE, 2020


FAIXA ETÁRIA



N = 3.450


Fonte: Sinan. Dados sujeitos a alteração.

SEXO



N = 3.450

RAÇA/COR




N = 3.450

4

COINFEÇÃO TB/HIV

Proporção de testagem para HIV e de coinfeção TB/HIV entre os casos novos de tuberculose, MG, 2010 a 2019




Fonte: Sinan. Dados sujeitos a alteração.

5

DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE PULMONAR

Proporção de casos novos de tuberculose pulmonar confirmados laboratorialmente, por Unidade Regional de Saúde, 2020




Fonte: Sinan. Dados sujeitos a alteração;

- Casos confirmados por critério laboratorial: Diagnóstico de tuberculose confirmado por um ou mais exames bacteriológicos positivos (baciloscopia de escarro, teste rápido molecular para tuberculose - TRM-TB ou cultura de escarro).

6

TUBERCULOSE SENSÍVEL E DROGARRESISTENTE

Proporção de casos de tuberculose sensível (2019) e tuberculose drogarresistente – TB DR (2018)*, de acordo com os desfechos



Fontes: Sinan; SIM; Sistema de Informação de Tratamentos Especiais de Tuberculose (SITE-TB). Dados sujeitos a alteração.

- TB sensível: casos de tuberculose que não possuem resistência identificada aos medicamentos antituberculose do esquema básico (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol);
- TB DR: Casos de tuberculose com resistência aos medicamentos antituberculose do esquema básico;

* Casos de TBDR extraídos via SITE-TB.