

Os sinais de alarme podem surgir a partir do 3º dia da doença, mesmo que já tenha abaixado a febre, e sugerem piora da doença. Caso apresente um desses sinais procure o serviço de saúde.

SINAIS DE ALARME:

- ✓ Dor forte e constante na barriga
- ✓ Vômitos frequentes
- ✓ Dificuldade pra respirar
- ✓ Sensação de tontura e/ou desmaio
- ✓ Sangramentos
- ✓ Agitação e muita sonolência

ORIENTAÇÕES AO PACIENTE:

- ✓ Fique em repouso
- ✓ Beba no mínimo 2 litros de líquido por dia, entre água, chá, suco, água de coco, leite, sopa e soro hidratante (pode ser caseiro). O soro hidratante é fornecido nas Unidades Básicas de Saúde.

Receita de soro caseiro
1 colher de café de sal de cozinha
2 colheres de sopa de açúcar

- ✓ Não use medicamentos para dor e febre que contenham Ácido Acetil Salicílico (AAS) durante o período da doença.
- ✓ As mulheres com dengue devem continuar amamentando.



Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Saúde
Subsecretaria de Vigilância à Saúde
Superintendência de Vigilância Epidemiológica
Diretoria de Vigilância de Agravos Transmissíveis
Coordenação Estadual de Vigilância das Arboviroses

CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO DENGUE / ZIKA

Nome do paciente:

Nome da mãe:

Data de nascimento:

Sexo:

Telefone:

Bairro:

Nº do cartão SUS/Prontuário:

Unidade de referência:



SAÚDE



MINAS
GERAIS

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

APRESENTAR O CARTÃO SEMPRE QUE
RETORNAR À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Data de início dos Sintomas: ____/____/____

ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE

DATA	PA EM PÉ	PA DEITADO	PROVA DO LAÇO	TEMPERATURA	SANGRAMENTO

COLETA DE EXAMES

DATA	LABORATÓRIO	HEMATÓCRITO	PLAQUETAS	LEUCÓCITOS

Ns1 ____/____/____

Isolamento Viral ____/____/____


Sorologia ____/____/____

Presença de comorbidades

Medicações em uso

Observações:

EVOLUÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL DA DENGUE



Fonte: World Health Organization - Who (2009), com adaptações.