



ESCORE DE RISCO ABSOLUTO DE FRAMINGHAM

NOME CIVIL DO(A) PACIENTE: _____ DATA: ____/____/____

NOME SOCIAL DO(A) PACIENTE: _____

MÉDICO: _____ ASSINATURA/CARIMBO: _____

Escore de risco de Framingham														
Homens						Mulheres								
Idade		Pontos				Idade		Pontos						
20-34		-9				20-34		-7						
35-39		-4				35-39		-3						
40-44		0				40-44		0						
45-49		3				45-49		3						
50-54		6				50-54		6						
55-59		8				55-59		8						
60-64		10				60-64		10						
65-69		11				65-69		12						
70-74		12				70-74		14						
75-79		13				75-79		16						
Colesterol Total mg/dL	idade	idade	idade	idade	idade	Colesterol Total mg/dL	idade	idade	idade	idade				
	20-39	40-49	50-59	60-69	70-79		20-39	40-49	50-59	60-69	70-79			
Até 160	0	0	0	0	0	Até 160	0	0	0	0				
160-199	4	3	2	1	0	160-199	4	3	2	1				
200-239	7	5	3	1	0	200-239	8	6	4	2				
240-279	9	6	4	2	1	240-279	11	8	5	3				
280 ou mais	11	8	5	3	1	280 ou mais	13	10	7	4				
Fumo	idade	idade	idade	idade	idade	Fumo	idade	idade	idade	idade				
	20-39	40-49	50-59	60-69	70-79		20-39	40-49	50-59	60-69	70-79			
Não	0	0	0	0	0	Não	0	0	0	0				
Sim	8	5	3	1	1	Sim	9	7	4	2				
HDL colesterol (mg/dL)			Pontos			HDL colesterol (mg/dL)			Pontos					
60 ou mais			-1			60 ou mais			-1					
50-59			0			50-59			0					
40-49			1			40-49			1					
menos de 40			2			menos de 40			2					
PA (sist. mm Hg)			não tratada		tratada	PA (sist. mm Hg)			não tratada					
menor 120			0		0	menor 120			0					
120-129			0		1	120-129			1					
130-139			1		2	130-139			2					
140-159			1		2	140-159			3					
160 ou maior			2		3	160 ou maior			4					
Total de pontos		Risco absoluto em 10 anos (%)				Total de pontos		Risco absoluto em 10 anos (%)						
menos de 0		Menos de 1				Menos de 9		Menos de 0						
0		1				9		1						
1		1				10		1						
2		1				11		1						
3		1				12		1						
4		1				13		2						
5		2				14		2						
6		2				15		3						
7		3				16		4						
8		4				17		5						
9		5				18		6						
10		6				19		8						
11		8				20		11						
12		10				21		14						
13		12				22		17						
14		16				23		22						
15		20				24		27						
16		25				25 ou mais		30 ou mais						
17 ou mais		30 ou mais												



CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DE HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR (OMS)

NOME CIVIL DO(A) PACIENTE: _____ DATA: ____/____/____

NOME SOCIAL DO(A) PACIENTE: _____

MÉDICO: _____ ASSINATURA/CARIMBO: _____

Critérios Diagnósticos de Hipercolesterolemia Familiar (OMS)	
Critérios	Pontos
História familiar	
Familiar de primeiro grau com doença aterosclerótica prematura (homens com menos de 55 anos e mulheres com menos de 60 anos)	1
Familiar de primeiro grau com LDL-C acima do percentil 95	
Familiar de primeiro grau com xantoma tendinoso quarcó córneo Criança (menores de 18 anos) com LDL-C acima do percentil 95	2
História clínica	
Paciente com doença arterial coronariana prematura (homens com menos de 55 anos e mulheres com menos de 60 anos)	2
Paciente com doença arterial cerebral ou periférica prematura (homens com menos de 55 anos e mulheres com menos de 60 anos)	1
Exame físico	
Xantoma tendinoso	6
Arco córneo antes dos 45 anos	4
Exames laboratoriais	
LDL-C maiores ou iguais a 330 mg/dl	8
LDL-C entre 250 e 329 mg/dl	5
LDL-C entre 190 e 249 mg/dl	3
LDL-C entre 155 e 189 mg/dl	1
Mutação genética presente	8
TOTAL DE PONTOS	

Diagnóstico de hipercolesterolemia familiar é	
Definitivo com	Mais de 8 pontos
Provável com	6-8 pontos
Possível com	3-5 pontos

(Apêndice da Port. SAS/MS nº 200/2013)